



پیاز کاشت - بائر کے ساتھ



کونفیڈور®

20 نیصد ایس ایل

رس چوس کیڑوں سے بچائے
اسٹریس ہونے نہ پائے



خصوصیات:

- لمسی اثر، سرایت پذیری کی وجہ سے چھپے ہوئے کیڑوں پر بھی موثر
- فصل رہے سربراہ اور زیادہ پیداوار دینے کے قابل بنائے
- کسان دوست کیڑوں کے لیے موزوں، IPM پروگرام میں معادن

سفارشات برائے استعمال

پی ایچ آئی	پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
7 دن	7 دن	250 ملی لیٹر فی ایکڑ	قریض	پیاز

*پیزی ہار دبیسٹ انٹرول (آخری اپہرے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)

پیاز پاکستان میں کاشت کی جانے والی سبزیوں میں آلو کے بعد دسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان میں پیاز تقریباً 3 لاکھ بچپاں ہر ایکڑ سے زائد رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے۔ پیاز ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہونے والی عام سبزی ہے۔

پاکستان میں پیاز کی کاشت چاروں صوبوں میں کی جاتی ہے۔ پیاز کی کاشت میں سندھ پہلے، پنجاب دوسرے، بلوچستان تیسرا اور خیبر پختونخواہ چوتھے نمبر پر ہے۔


پیاز کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اس کی پیداوار میں اضافہ اور مختلف مرحلے پر آنے والے بیماریوں اور کیڑوں سے بچانا نہایت ضروری ہے۔

باز پاکستان کے پاس ان تمام بیماریوں اور کیڑوں کا مکمل حل موجود ہے، جو کہ نہ صرف کاشتکار کی فصل کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ پیداوار میں یقینی اضافے کا سبب بھی ہے۔

کونفیڈور® هووبیٹو® انٹریکول® بے فولان®

20 نیصد ایس ایل 240 ایس ایل 8-8-6 نیصد ڈبلیوپی

اینپی سے یکپوڈ ٹیکٹیلزرو اور کراب سپلائیٹ



انٹرَاکول®

70 نیصد ڈبیوپی

پیاز رہے بیماریوں سے محفوظ



خصوصیات:

- پرپل بلائچ اور ڈاؤنی ملڈیو کے خلاف انتہائی موثر
- پودوں کے اوپر حفاظتی تہبہ بنانے کے بیاری کوروں کے
- زکر کی اضافی طاقت کے ساتھ، پودے کی بہتر نشوونما

سفارشات برائے استعمال

پی ایچ آئی	شرح استعمال	پیاری	فصل
14-7 دن	500 گرام فی ایکٹر	پرپل بلائچ اور ڈاؤنی ملڈیو	پیاز

*پرپل بلائچ اسٹرول (آخری اپسے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)

ھوبیٹو®

240 ایس سی

پیاز میں تھرپس کا جدید حل



خصوصیات:

- دو طرفہ سرایت پذیری کی وجہ سے تھرپس کا شروع کے مرحلہ میں ہی کنٹرول
- ثبت اثرات سے فصل رہے ہری بھری۔ فصل پکوئی دباؤ نہیں
- اندروںی پتوں میں چھپے ہوئے تھرپس پر بھی موثر کنٹرول

سفارشات برائے استعمال

پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
1 دن	125 مل لیٹر فی ایکٹر + 250 ملی لیٹر باکیو پاور (ایمی جوویٹ) فی ایکٹر	تھرپس	پیاز

*پرپل بلائچ اسٹرول (آخری اپسے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)

احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر



چشمہ

آنکھوں کی حفاظت کے لیے
چشمے پا استعمال کریں۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں کہ
زہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



دستانے

دستانے پہنچنے تاکہ جلوں آپ کے
جلد میں جذب ہو کر لفсан دچانپا کے۔

- احتیاطی تدابیر:**
- لیبل کو غور سے پڑھیں اور دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پرخی سے عمل کریں۔
 - زہر کے کام کے دوران حفاظتی بیس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
 - زہر کو پچھل، پالت جانوروں کی پتی، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور رہیں۔



بانر پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

ہیڈ آفس: پلات نمبر 23، بکٹر 22، کونگ انڈسٹریل امیریا، کراچی 74900
یاۓ این: 021-3506068، فیس: 111-000-227

بے فولان®

8-8-6

این پی کے لیکوڈ فریلاائزر اور کراپ سپلائمنٹ

پیداوار زیادہ - خوشحالی کا وعدہ



خصوصیات:

- پودے کی مذائقی تلاٹ پوری کرے
- تیزی سے سرایت پذیر ہونے والی NPK فریلاائزر اور کراپ سپلائمنٹ
- فوکیوا پر سے فصل رہے سرہنگ و شاداب

سفارشات برائے استعمال

فصل	شرح استعمال
پیاز	250 ملی لیتری ایکٹر

*پری ہار ویسٹ انٹرول (آخری اپسے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)