



بائر بھرپور آکر





آلو کی کاشت سے برداشت تک

آلو پاکستان کی ایک انتہائی اہم غذائی فصل ہے جو کہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ کے رقبہ پر کاشت کی جا رہی ہے۔ آلو کی کاشت میں پنجاب پہلے نمبر پر ہے جو کہ کل پیداوار کا 96% پیدا کرتا ہے، جبکہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔

آلو کی صحت مند اور بھرپور فصل نہ صرف ملکی غذائی ضروریات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ کاشت کار کے نفع اور خوشحالی کا بھی سبب بنتی ہے۔ بائزر کی اولین ترجیح کاشت کار کی کامیابی ہے یہی وجہ ہے کہ بائزر نے آلو کی فصل کے لیے عمدہ اور موثر زرعی زہروں کی وسیع رینج فراہم کی ہے یہ زہر فصل کو ہر مرحلے پر بھرپور تحفظ دیتے ہیں جس سے ملے زیادہ پیداوار یعنی کاشت کار خوشحال۔

بائزر کی ایمیسٹو، چیلنج، انٹراکول، انفنیٹو
میلوڈی ڈیو، بے فلولان، ایلیٹ، بیلٹ، ہووینٹو

آلو کی فصل کو جڑی بوٹیوں، بیماریوں اور کیڑوں سے بچاتے ہیں۔ فصل کی بہتر نگہداشت اور بھرپور پیداوار کے ضامن ہیں۔



پیداوار میں اضافہ - منافع بھی زیادہ



آلو کے بیج پر جدید سیڈ ٹریٹمنٹ ایمیستو کے فوائد

- 🌱 فصل کی بھرپور شروعات
- 🌱 رانز وکٹونیا کے خلاف بہتر کنٹرول
- 🌱 بیماری سے پاک - چمکدار پیداوار
- 🌱 رانز وکٹونیا (پتڑی) کے نقصانات
- 🌱 جڑوں کی ادھوری نشوونما کے سبب آلو کی تعداد میں کمی
- 🌱 پودوں میں بیماری کے خلاف توتہ مدافعت میں کمی
- 🌱 آلو کا معیار متاثر ہونا اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار استعمال	وقت استعمال
آلو	رانز وکٹونیا سولانی	10 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام بیج (160 ملی لیٹر بوتل فی ایکڑ)	بیج لگانے سے پہلے

لیبل پر درج سفارشات کے مطابق استعمال کرنے سے پری ہارویسٹ انٹرول کی ضرورت نہیں۔



رانز وکٹونیا سولانی

طریقہ استعمال

پلاسٹک شیٹ کا طریقہ کار
10 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام بیج 1 بوری کے لیے

بذریعہ پلانٹر



ایک ایکڑ کے لیے 20 لیٹر پانی میں 160ml
یعنی ایک بوتل ایمپیسٹو ملا کر محلول بنائیں

ایمپیسٹو بیج پر لگانے کے لئے پلانٹر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اس طریقہ استعمال کے ذریعے پلانٹر کے ساتھ ایک عدد اسپرے مشین لگادی جاتی
ہے جو دوران بھائی بیج مسلسل اسپرے کرتی ہے۔ جس سے قومی طور پر سیڈز ٹینٹ
ہو جاتی ہے۔

ایمپیسٹو کی ایک بوتل 16 بور یوں کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔

مزید معلومات کے لئے ایمپیسٹو کے ڈیلریا بازر کے نمائندے سے رابطہ کریں۔

4



پھر بیجوں کو
اچھی طرح بالائیں

3



اسپرے مشین سے
بیج والے آلوؤں پر
ایمپیسٹو
اسپرے کریں

2



100 گلو بیج کے لیے
ایک لیٹر پانی میں 10ml
ایمپیسٹو ملا کر
محلول بنائیں

1



1 بوری آلو کے بیج
زمین پر پھیلا دیں

8




اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے
ضرورت کے مطابق اپنے نامہ
بیج پر ایمپیسٹو لگائیں
اور کاشت کریں

7



جب ایمپیسٹو
بیج پر خشک ہو جائے تو
پلانٹر میں ڈال کر کاشت کریں

6



پھر تصویر میں دیئے گئے
طریقے سے دوبارہ پلائیں
تاکہ ایمپیسٹو آلو کے
بیج پر اچھی طرح لگ جائے

5



اب دوبارہ بیج پر
ایمپیسٹو لگائیں
اسپرے کریں

یاد رکھیں پودے اگر صحت مند ہوں گے تو بیماریاں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گی، ایمپیسٹو پودوں کو صحت مند بناتا ہے۔

جڑی بوٹیوں سے پاک فصل



خصوصیات:

- وسیع دائرہ اثر سے آلو کی فصل کو نقصان پہنچانے والی چوڑے پتوں والی اور گھاس والی جڑی بوٹیوں کا ایک ساتھ خاتمہ
- فصل کے ابتدائی مرحلے میں جڑی بوٹیوں کے اگاؤ سے قبل اسپرے کرنے سے پودوں کی مکمل نشوونما
- چیلنج فصل کو اسٹریس نہیں دیتا، جس سے فصل بے صحت مند اور خوشنما

سفارشات برائے استعمال

فصل	جڑی بوٹیاں	مقدار استعمال
آلو	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	400-500 ملی لیٹر/ایکڑ

سفارشات کے مطابق استعمال کرنے پر PHI کی ضرورت نہیں



اگیتا جھلساؤ سے مکمل تحفظ



انسٹراکول®
70 فیصد ڈیلیوپنی

خصوصیات:

- اگیتا جھلساؤ کے خلاف مؤثر
- پودوں کے اوپر حفاظتی تہہ بنا کر بیماری کو روکے، دیرپا اثر
- زنگ کی اضافی طاقت کے ساتھ، پودے کی بہتر نشوونما



اگیتا جھلساؤ

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	اگیتا جھلساؤ	500 گرام / ایکڑ	14 دن

*پری ہارویسٹ انٹرول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)

انسٹراکول® بائزکراپ سائنس کا ایک منفرد زرعی زہر ہے جو آلو کی فصل کے اگیتا جھلساؤ کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ پودوں کے اوپر حفاظتی تہہ بنالیتا ہے، جس سے بیماری کے جراثیم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ **انسٹراکول®** میں زنگ کی اضافی طاقت موجود ہے جو پودے کی بھرپور نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

جھلساؤ کا علاج کل نہیں آج!



خصوصیات:

- چھینا جھلساؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔
- ٹرانسلیمپیر اور سرائیت دوہرا اثر رکھتا ہے۔
- پودے کے ہر حصے میں یکساں تقسیم سے فصل کی لمبے عرصے تک حفاظت کرتا ہے۔
- اسپرے کے ایک گھنٹے بعد بارش کی صورت میں بھی اثر برقرار

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	چھینا جھلساؤ	450-600 ملی لیٹر فی ایکڑ	5 دن
*پری ہارویسٹ انٹرول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)			

آلو کے جھلساؤ کا خاتمہ!



میلوڈی ڈیو
66.8 فیصد ڈیلپونی

خصوصیات:

- دو مختلف پھپھوندی کش زہروں کا مرکب، بالخصوص آلو کے پچھینا جھلساؤ پر مؤثر کنٹرول
- پتوں اور تنوں کے ذریعے پودوں کے نظام میں سرایت پذیر ہو کے بیماری کا خاتمہ کرے یعنی اندرونی اور بیرونی طور پر پودے محفوظ
- پودے میں فوری سرایت پذیر کی صلاحیت، بعد بارش ہونے کی صورت میں بھی اثر برقرار

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	*کچھینا جھلساؤ	500 گرام / ایکڑ	24 دن
	اگیتا جھلساؤ	300 گرام / ایکڑ	
*پری ہارویسٹ انٹرول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)			

(فصل کی حالت اور پھیلاؤ کے مطابق پانی کی مقدار فی ایکڑ استعمال کریں)

جھلساؤ والی بیماریاں حملہ آور ہونے کے بعد بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں اور تھوڑے ہی وقت میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ **میلوڈی ڈیو** کو فصل پر بطور حفاظتی اسپرے (Preventive Spray) بیماری کا حملہ شروع ہونے سے پہلے استعمال کیا جائے اور مناسب وقفے سے اسپرے دہرایا جائے تاکہ نئے بننے والے حصوں کی بھی حفاظت ہو سکے۔



پچھینا جھلساؤ



اگیتا جھلساؤ

پیداوار زیادہ خوشحالی کا وعدہ



بے فنولان®
کراپ سپلیمنٹ

خصوصیات:

- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- تیزی سے سرایت پذیر ہونے والی
- NPK فرٹیلائزر اور کراپ سپلیمنٹ



سفارشات برائے استعمال

فصل	مقدار استعمال
آلو	250 ملی لیٹر فی ایکڑ
• پہلا اسپرے 45 دن کی فصل پر • دوسرا اسپرے 15 دن کے وقفے سے	

بیماریوں سے محفوظ فصل



ایلیٹ®
80 فیصد ڈیلٹیوٹی



خصوصیات:

- پہلا حقیقی سرایت پذیر پھونڈی کش زہر
- اوپر اور نیچے کی سمت سرایت پذیری سے ملے بیماری پر دیر پا اور مؤثر کنٹرول
- پودے کے اندر تیزی سے جذب ہونے کے سبب بارش سے اثر ضائع نہیں ہوتا
- فصل کو رکھے صحت مند اور محفوظ

سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	چھتیا جھلساؤ	250 گرام فی 100 لیٹر پانی	7-15 دن
*پری ہارویسٹ انٹروال (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)			

سائنس ایسی، جادو جیسی

سُنڈیوں کے خلاف دیرپا اور مؤثر کنٹرول



خصوصیات:

- منفرد طریقہ اثر کی بدولت سنڈی پردیرپا اور مؤثر کنٹرول
- Translaminar ہونے کی صلاحیت سے پتوں کے نیچے چھپی ہوئی سنڈیوں کے خلاف بھی مؤثر
- وسیع الاثر سنڈی مارز ہر اور فصل پر کوئی دباؤ نہیں

سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	ہیبی اوتھس	20 ملی لیٹر / ایکڑ	07 دن



ہیبی اوتھس

*پری ہارویسٹ انٹرول (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)

سفید مکھی اور ایفڈ مارمٹائے آلو کی فصل بھرپور آئے



خصوصیات:

- دو طرفہ سرائیت پذیری کی وجہ سے سفید مکھی اور ایفڈ پر دیر پا اور مؤثر کنٹرول
- فصل رہے سرسبز
- فصل کے ہر مرحلے پر قابل استعمال

سفارشات برائے استعمال


فصل	کیڑے	مقدار استعمال	*پی ایچ آئی
آلو	ایفڈ، سفید مکھی	125 ملی لیٹر فی ایکڑ + ایڈجوبینٹ (باغیچہ پادر) 250 ملی لیٹر فی ایکڑ	1-3 دن
*پری ہارویسٹ انٹروال (آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)			



ایفڈز



سفید مکھی



- قدرتی حالت کی صورت میں بے فتولان کا پکا پھرے 45 دن پر اور دوسرا پھرے 15 دن کے بعد کریں۔
- فطری سنڈی کے حلقے کی صورت میں 30 دن کے بعد **بیلٹ** استعمال کریں۔
- سفید کمی کے حلقے کی صورت میں 30 دن کے بعد **ہوویٹو** استعمال کریں۔
- اگر چٹائی برقرار رہے تو 80 دن بعد **بیلٹ** کا پھرے کریں۔



ساقوں پرے



آلو کے
چھسلا کا علاج

چمنا پھرے



چھسلا کا علاج
کل حوض آج

پانچواں پھرے



آلو کے
چھسلا کا علاج

چوتھا پھرے



چھسلا کا علاج
کل حوض آج

تیسرا پھرے



آلو کے
چھسلا کا علاج

دوسرا پھرے



آلو کے
چھسلا کا علاج

پہلا پھرے



پیداوار میں اضافہ
جاری یوشیوں
سے پاک فصل



پیداوار میں اضافہ
جاری یوشیوں
سے پاک فصل

45 دن — بے فتولان — 60 دن



کتابچہ موبائل ایپ



احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر

- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر تفتی سے عمل کریں۔ ● زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔ ● تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے محلول کو اسپرے مشین سے بہنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ اور کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔ ● زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھو لیں۔
- اسپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھو لیں۔
- زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلود پانی کو اسپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگاہوں کو خراب نہ کریں۔



دستانے



ماسک
ماسک کا استعمال کریں تاکہ
فرہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



چشمہ
آنکھوں کی صحت کے لیے
نیشے کا استعمال کریں۔



بائری پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23 سیکٹر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900، پوائے این: 227-000-111، فیکس: (021) 3506068

ویب سائٹ: www.bayer.com.pk