



بائِر بِهْرِ پُور مِرج



پاکستان میں مرچ کی کاشت تقریباً ڈبھلا کھا کیٹر پر کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ کاشت صوبہ سندھ میں کی جاتی ہے، جو کہ پورے پاکستان کا 85 فیصد لال مرچ پیدا کرتا ہے۔ جس میں میر پور خاص، عمر کوت، کنزی اور نوکوت نمایاں ہیں۔ کنزی کو لال مرچ کے حوالے سے ایشیاء کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر صوبہ پنجاب، تیسرا نمبر پر بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا ہے۔

مرچ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر اس کی پیداوار میں اضافہ اور معیاری پیداوار نہایت ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے مرچ کو مختلف مراحل پر آنے والے کیڑوں اور بیماریوں سے بچانا نہایت اہم ہے۔

بائز پاکستان کے پاس ان تمام بیماریوں اور کیڑوں کا حل موجود ہے، جو کہ نہ صرف کاشتکار کی فصل کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ پیداوار میں یقینی اضافے کا سبب بھی ہے اور فصل بغیر کسی دباؤ کے بھر پور نشوونما پاتی ہے۔



اوپیرون® اسپیڈ

نیصد ایس سی

24

جوؤں سے بچائے، دیرپا اثر دکھائے



خصوصیات

- جوؤں کے انڑوں، بیچوں اور بالغ حالت پر یکساں اثر کا حامل واحد ہر
- لبے عرصے تک کنٹرول، بار بار اسپرے کی پریشانی سے نجات
- قہرپس پر بھی موثر کنٹرول اور فصل رہے سرہنزو شاداب

سفارشات برائے استعمال

*پارچہ آئی	مقدار استعمال	سیڑتے	فصل
30 دن	100 ملی لیٹر / ایکڑ	بیچیں اور قریبیں	مرج

*پری پار ویسٹ انٹول (آخری اپیسرے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)



نیدیوو

فیصدڈبليوجی 75

چمکدار پہل کاراز

ھووبیٹو®

ایس سی 240

سفید مکھی اور اس کے بچوں کے خلاف دو طرفہ وار



خصوصیات

- دو طرفہ سرائیت پذیری کی وجہ سے چھپی ہوئی سفید کھمی اور پھول پر دیریا پا اور موثر کنٹرول
- سفید کھمی پر دیریا پاٹر کی وجہ سے ان کی افزائش میں کمی
- فصل پر کوئی دباو نہیں اور ہے سر بزرو شاداب

سفارشات برائے استعمال

*پراج آٹی	مقدار استعمال	کیٹیے	فصل
1 دن	125 ملی لیٹر انٹروٹ + 250 ملی لیٹر انٹروٹ	سفید کھمی، ایفلڈر	مرج

*پرجی پار ولیٹ اسٹرول (آخری اپسے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)

خصوصیات

- منہ سڑی اور سفونی چھپوندی پر دیریا پا اور موثر کنٹرول
- بیماری سے بچائے، پھل زیادہ لائے
- فصل پر کوئی اسٹریں نہیں اور بنے معیاری پیداوار

سفارشات برائے استعمال

*پراج آٹی	مقدار استعمال	بیماری	فصل
5 دن	90 گرام نی 100 لیتر پانی	منہ سڑی سفونی چھپوندی	مرج

*پرجی پار ولیٹ اسٹرول (آخری اپسے اور برد اشت کے درمیان وقفہ)

انٹرائکول[®]

فیصد ڈبلیوپی 70

مِرچ رہے بیماریوں سے محفوظ



سُندیوں کے خلاف دیرپا اور موثر کنٹرول



خصوصیات

- ملنڈیوں اور بلائیٹ یک کے خلاف موثر
- پودوں کے پتوں پر ٹھہر کر بیماری کو روکے
- زنک کی اضافی طاقت کے ساتھ پودے کی بہتر نشونما

سفارشات برائے استعمال

پر رج آٹی	مقدار استعمال	بیماری	فصل
7 سے 14 دن	500 گرام / ایکٹا	بجلاؤ	مرچ

*پری ہار ویسٹ انٹرول (آخری اپسے اور بدداشت کے درمیان وقفہ)

خصوصیات

- مففر طریقہ اٹر کی بدولت سُندی پر دیرپا اور موثر کنٹرول
- Translaminar ہونے کی صلاحیت سے پتوں کے نیچے پھنسی ہوئی سُندیوں کے خلاف بھی موثر
- وسیع الاثر سُندی مارز ہر - مرچ بنے معیاری

سفارشات برائے استعمال

پر رج آٹی	مقدار استعمال	سیڑیے	فصل
07 دن	10 ملی لیٹر / ایکٹا	کھلکھلی سیڑی افروٹ بورا	مرچ

*پری ہار ویسٹ انٹرول (آخری اپسے اور بدداشت کے درمیان وقفہ)

بے فولان®

8-8-6

این پی کے لیکوڈ فریلائزر اور کراپ سپلائمنٹ

پیداوار زیادہ، خوشحالی کا وعدہ



دستانے

دستانے پہنیں تاکہ ملول آپ کی
جلد میں جذب ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں تاکہ
زہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



چشمہ

آنکھوں کی حفاظت کے لیے
چشمے کا استعمال کریں۔



خصوصیات

- پتے کی رگت میں بہتری لائے
- مکمل اور متوازن غذا نیت کا ذریعہ
- تیزی سے رہائیت پذیر ہونے والی NPK فریلائزر اور کراپ سپلائمنٹ

سفارشات برائے استعمال

وقت استعمال	شرح استعمال مقدار/ایکڑ	فصل
فضل کی نشووفہ کے آغاز میں استعمال کروں۔	250 میلی لیٹر فی ایکڑ	مرجع

* پری ہار دیسٹریٹریٹریول (آخری اپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ)

احتیاطی تدابیر:

- پرودوکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے مخلوق کو اسپرے مشین سے بہنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی چھوار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔
- اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکونو شی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکونو شی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اسپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابین سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلاود پانی کو اسپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلاودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزر گاہوں کو خراب نہ کریں۔
- شہد کی بکھیوں اور مچھلیوں کے لیے مضر ہے۔



بائپاکستان (پرائیویٹ) لمبیڈ

ھیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23، سکریٹری افسریل، گلی 74900، ڈیکٹ: 22، کوئٹہ، سندھ، پاکستان
(021) 3506068: فیکس، 111-000-227: موبائل