



# ترشاوه پھلوں کی پیداواری ٹیکنالوژی





ترشاوہ پھلوں کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں ہے۔ ان کی طلب میں نصرف اندر وون ملک بلکہ بیرون ملک بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ نہ صرف باغبانوں کے لئے آمدی کا اہم وسیلہ ہیں بلکہ ملک و قوم کے لئے قیمتی زیرِ مبادلہ کمانے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باغبان حضرات ان کی پیداوار کو بڑھانے اور معیار کو بہتر سے بہتر بنانے میں پہلے سے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پھلوں کے زیرِ کاشت رقبے میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باغات کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے پہنچنے والے نقصانات سے بچایا جائے۔


## ایلیٹ®، انڈرَاکول®، ہووبینٹو® اور بے فولان®

ترشاوہ پھلوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔



## باغات میں سوکھا، گوند کا بہنا، چھال کا اترنا، کے لیے بہترین حل

پہلا حقیقی سرائیت پندرہ پچھوندی کش زہر جو کرے پورے پودے میں پھیل کر  
تنے اور جڑوں کے گلنے سڑنے کا موثر کنٹول کرتا ہے



ایلیٹ پودے میں نظام کا حصہ بن کر  
بیماری کے خلاف قوتِ مدافعت  
بڑھاتا ہے۔

ایلیٹ پودے میں جذب ہو کر پتوں  
اور تنوں کے ذریعے چاروں طرف  
پھیل جاتا ہے۔

ایلیٹ اسپرے ہوتے ہی پودے  
میں جذب ہو جاتا ہے۔

### خصوصیات

- پہلا اور حقیقی سرائیت پندرہ پچھوندی کش زہر جو پودے کے اندر ورنی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔
- اوپر کی سمت اور نیچے کی جانب سرائیت پندرہ کی خاصیت پودے کے ہر حصہ کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔
- پودے کے اندر تیزی سے سرائیت پندرہ ہونے کے سبب بارش سے اس کا اثر ضائع نہیں ہوتا۔
- دیر پاٹر کے سبب لمبے عرصے تک بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
- نئی شاخوں کو بیماری سے بچائے




### سفارشات برائے استعمال

فصل	بیماری	فی 100 لیٹر پانی شرح استعمال
ترشاوہ پھل	ستنے کا گلنا سڑنا گوند کا بہنا	250 گرام

## ترشاوہ پھلوں کی بیماریوں کے لئے پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پھپھوندی کش زہر

**انٹرَاکول®** اپنے منفرد Multi-site طریقہ اثر کی بدولت نہ صرف پودے کو بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ پھپھوندی کے نظام تنفس کے کئی حصوں پر بیک وقت حملہ کر کے اس کے نشاستہ اور بروٹین بنانے کے نظام کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ نتیجتاً پھپھوندی کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے اور اس طرح اس پر موثر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ انٹرَاکول میں شامل زینک پودوں کے لئے غیر معمولی غذائیت پیش جزو ہے۔ انٹرَاکول خشک موسم یا بارش جیسے ناموافق حالات میں بھی کارگر ہے اور اس میں **ریکٹ+** شامل ہونے کی وجہ سے فصل ہری بھری رہتی ہے۔



### سفارشات برائے استعمال

شرح استعمال فی 100 لیٹر پانی	بیماری	فصل
250 گرام	پھل کی ڈنڈی کا گل جانا سوکھا	ترشاوہ پھل

## انٹرَاکول® ریکٹ+

تحفظ، مدافعت، زیادہ پیداوار



# ھووبیٹو®

ایس سی 240



## اسکلیز اور ملی گ ب کے خلاف موثر کنٹرول

**خصوصیات:**

- دو طرفہ سرائیت پذیری کی وجہ سے اسکلیز اور ملی گ ب کا دیریا اور بہترین کنٹرول
- اسکلیز اور ملی گ ب کے بالغ اور بچوں پر موثر
- پودے کی نالیوں میں جذب ہو کر ان جگہوں میں بھی پہنچتا ہے جہاں عام زہر نہیں پہنچ سکتے۔



### سفارشات برائے استعمال

فصل	کیڑے	شرح استعمال فی 100 لیٹر پانی
ترشاوہ بچل	اسکلیز، ملی گ ب	50-40 ملی لیٹر فی ایکر ایڈج وینٹ (بايج پار) + 50 ملی لیٹر

نوت: ھووبیٹو کو ایدج وینٹ (بانیو پار) کے ساتھ لایا کر جو یور کردہ طریقے کے مطابق استعمال کریں۔



# بے فولان®

8-8-6

این بی کے لیکوڈ ہنٹیلائزر  
اوکر کراپ سپلائمنٹ

## پیداوار زیادہ، خوشحالی کا وعدہ!

### خصوصیات:

- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- مکمل اور متوازن غذاائیت کا ذریعہ
- پتے کی رنگت میں بہتری لائے
- پتے اور پھولوں کی بہتر نشوونما



### سفارشات برائے استعمال

فصل	شرح استعمال	وقت استعمال
ترشاوہ پھل	250 مل لیٹرنی ایکٹر	فصل کی نشوونما کے آغاز پر / پھل یا پھول آنے سے پہلہ استعمال کروں۔ خوردہ کے طبق 14 دن کے وقت سے دوبارہ اپنے کریں۔

## ترشاوہ پھلوں

کے باغات کی سالانہ تکمیل داشت  
ماہ بہ ماہ.... کام کی باتیں

### مارچ

- پیوند کاری شروع کر دیں۔  
(پیوند میں سے ایک فٹ اونچا ہونا چاہئے)
- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔
- کیتوں اور ٹوٹیلیت کی برداشت جاری رکھیں۔

### فروری

- نامکمل ہجن کی آدمی اور فاسکورس اور پٹاٹا شکر کی ساری مقادار 15 فوری تک گزدی کر کے رکھیں۔
- پودوں پر زمک کا اپرے کریں۔
- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔

### بہمنی

- کرے سے بیجا کلیے پانی لٹکائیں یا دھواں دے۔
- پھنے پودوں پر لئے نمری سے پودوں کا انتقال کریں۔
- مالناگر ہپ فروٹ اور یہوں کی برداشت جاری رکھیں۔

### مئی اور جون

- آپاشی چاری رکھیں اور ووچہ 15 دن سے کم کر کے 7 سے 10 دن کر دیں۔
- پودوں کے اندر اگنے والی نرم اور غیر ضروری شاخیں کاٹ دیں۔

### صحت منداور بھر پور پیداوار کیلئے



### ستمبر

- پانی کا وقفہ بڑھا کر 15 دن کر دیں۔
- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔
- ضرورت کے مطابق نامکمل ہجن کا ماد کی تیزی قطع دلیں۔

### ان کا استعمال ان 4 ماہ ضرور بیجھے!

### دسمبر

- پانی کا وقفہ 30 دن کر دیں۔
- فیوٹر ارالی، موکھی اور گریپ فروٹ کی برداشت جاری رکھیں۔
- خشک بیمار اور غیر ضروری شاخوں کو 2-3 سینٹی میٹر سبز شاخ کے ساتھ کاٹیں۔

### نومبر

- پانی کا وقفہ 21 دن رکھیں۔
- فیوٹر ارالی کی برداشت شروع کریں۔

### اکتوبر

- پیوند کاری کا عمل مکمل کریں۔
- پانی کا وقفہ بڑھا کر 21 دن کر دیں۔
- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔

### اپریل

- نامکمل ہجن کی بیٹایا آدمی کا ماد 15 اپریل تک ڈال دیں۔
- پھنے پودوں پر نچے سے پھوٹے والی غیر ضروری شاخوں کی کٹائی کریں۔
- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔

### جولائی اور آگسٹ

- کیڑوں اور بیماریوں کے لئے اپرے کریں۔
- نئی کی برداشت کا عمل شروع کریں اور برداشت کے بعد نامکمل ہجن کا ماد روزانہ لیں۔
- نمری میں پیوند کاری شروع کر دیں۔



## بائپاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

ھیڈ آفس: پلات نمبر 23، سکنر 22، کونگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900  
یوائے این: 021-3506068، فیکس: 111-000-227