



# بائے ر بھر پور کپاس



# باعر بھر پور گپس



0 دن	1 سے 0 دن	35-40 دن	45-50 دن	51-60 دن	61-70 دن	71-80 دن
سید فریٹ	جزی بولیاں	جیسہ تھرپس	ماکس	سفید کھنچی، گابی سندھی	سفید کھنچی	جیسہ تھرپس، گابی سندھی
ہربی سائید	ہربی سائید	کیڑے مار (میک مکس)	کیڑے مار	کیڑے مار (میک مکس)	کیڑے مار (میک مکس)	کیڑے مار (میک مکس)
اسوس میرٹ	ایس میڈول اکٹو	گوریڈوز + ڈیسیس شپر	اوپیرون	ہووبیٹو + ڈیسیس شپر	ہووبیٹو	اسینا میرٹ
ایس میڈول اکٹو	ایس میڈول اکٹو	کوریڈوز	کوریڈوز	کوریڈوز	کوریڈوز + ڈیسیس شپر	کوریڈوز

بیلٹ  
اگر لکھری سندھی کا جملہ ہو  
تو بیلٹ مالیں



پھولان  
بیدار ریڈا  
خوشحال کا وعدہ



# بائے بھر پور کپاس

کپاس کی فصل کو ابتداء ہی سے رس چونے والے کیڑوں خصوصاً سفید مکھی، سبز تیلا،  
تھرپس اور سنڈیوں خصوصاً گلابی سنڈی اور لشکری سنڈی وغیرہ کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔

کپاس کی فصل کی بہترین دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے بائز پیش کرتا ہے ایک مکمل پروگرام  
جس میں **ہومبریٹ**<sup>®</sup>، **ایس میٹولاکلور**، **کونفیڈور**، **کوریڈور**، **اوبیرون**<sup>®</sup> اسپید،  
**ہووینٹو**<sup>®</sup>، **ڈیسس سپر**، **اسپیٹا میپرد**<sup>®</sup> اور **بے فولان**<sup>®</sup> شامل ہیں۔  
8-8-6

یہ پروگرام ان پروڈکٹس کے استعمال کا وقت اور بہتر طریقہ کاربنتاتا ہے جس کی بدولت بڑھوتری،  
پھول گڈی اور ٹینڈوں کی بھرائی کے مرحلے پر کپاس کی فصل رس چونے والے کیڑوں  
اور سنڈیوں سے محفوظ رہتی ہے۔

ساتھ ہی زمیندار بھائی پہلے پھل کا فائدہ اٹھا کر بھر پور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔

## تمام غذا اور پانی صرف فصل کے بے



سیدٹریمنٹ

## کپاس کا صحت مند آغاز بنے کامیابی کی بنیاد



فوائد:

- گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا ایک ساتھ موثر کنٹرول
- جڑی بوٹیوں کے اُنگے سے پہلے ہی کنٹرول (اُنگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر اس زہر کا موثر کنٹرول نہیں ملتا)

### سفارشات برائے استعمال:

فصل	جڑی بوٹیاں	شرح استعمال
کپاس	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	800 ملی لیٹر فی ایکٹر

نوٹ: بیل پر درج سفارشات کے مطابق استعمال کرنے سے پری ہارویٹ اٹرول کی ضرورت نہیں۔

### طریقہ استعمال:

ایس میٹولاکلور کی سفارش کردہ مقدار کو 100 لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر محلول بنالیں۔ اسپرے کے لیے صرف ہاتھ والی نیپ سیک اسپرے میشن یا پاور اسپرے میشن ہر بیسا نیڈ نوزل لگا کر استعمال کریں۔ ایس میٹولاکلور کا اسپرے بجائی کے فوراً بعد (24 گھنٹے کے اندر) تروتر حالت میں جڑی بوٹیاں اُنگے سے پہلے کریں کیوں کہ اُنگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر اس زہر کا موثر اثر نہیں ہوتا۔



### سفارشات برائے استعمال:

فصل	کیٹیٹے اور بیمادی	شرح استعمال
کپاس	جیسٹ، سفید مکھی، ہتر پس اور فیوز اریسم ولٹ	10 ملی لیٹر / کلوگرام نیچ

نوٹ: بیل پر درج سفارشات کے مطابق استعمال کرنے سے پری ہارویٹ اٹرول کی ضرورت نہیں۔

### طریقہ استعمال:



5 کلو کپاس کے نیچ کے لیے 50 ملی لیٹر ہومبرے ایکسل کو 75 سے 100 ملی لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 7-6 ہو) میں ملا کر محلول بنالیں پھر استعمال کریں۔

سیدٹریمنٹ کے لیے پلاسٹک شیٹ یا سیدٹریمنٹ یونٹ استعمال کریں۔

کپاس کے نیچ کے لیے زبردست سیدٹریمنٹ

## سَبْزَتِيلے اور تھرپس کا خاتمہ



## رس چوس کیڑوں سے بچائے اسٹرلیس نہ ہونے پائے



**فوائد:**

- دو مختلف طریقہ اثر رکھنے والے زہروں کی بدولت رس چوس کیڑوں کا موثر کنٹرول
- دو طاقتور زہروں کا میک مکس (کونفیدور ایس ایل 250 ملی لیٹر + کوریلڈور 330 گرام) فی ایکٹر

### سفارشات برائے استعمال:

پی اچ جئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
14 دن	330 گرام فی ایکٹر	تھرپس، سبزتیلا	کپاس



\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### سفارشات برائے استعمال:

پی اچ جئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
40 دن	250 ملی لیٹر فی ایکٹر	ملی گب، سفید مکھی اور اس کے بچے سبزتیلا (جیسید) اور تھرپس	کپاس

\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### طریقۂ استعمال:

سفارش کردہ مقدار کو فی 100 لیٹر پانی (جس کی پی اچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم مشین سے جس میں ہالوکون نوزل لگی ہوئی ہو اسپرے کریں۔  
نوت: اسپرے کے موقع پر فصل میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔





### سفارشات برائے استعمال

* پی رجھ آئی	مقدارِ استعمال	سیڑھے	فصل
30 دن	100 ملی لیٹرنی ایکٹر	جوئیں اور تھرپس	کپاس

\*نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

#### طریقۂ استعمال:

استعمال سے پہلے یوتل دو اچھی طرح ہلا لیں۔

اوپیرون® اسپید کی سفارش کردہ مقدار فی ایکٹر 100 لیٹرن پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملاکر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم اسپرے میشن جس میں ہالوکون نوزنگی ہوئی ہو اسپرے کریں۔

## دوست وہی جو کام آئے

اوپیرون® اسپید سے ملے جوؤں اور تھرپس پر مثالی کنٹرول یعنی صحیح منفصل، ملے بھرپور منافع

#### منفرد خصوصیات

- نئی کیمسٹری (Avermectins group) اور Tetronic Acid group
- نئے طریقۂ اثر کی بدولت، مدافعت شدہ جوؤں اور تھرپس کے خلاف موثر
- لمسی اثر اور پتوں کے آرپار ہونے کی بنا پر تھرپس اور جوؤں کے انڈوں، بچوں اور بالغ حالت پر یکساں اثر کی حامل واحد زہر
- اوپیرون® اسپید** فصل بنائے سرسبز و شاداب یعنی ملے بھرپور پیداوار



دو دھبؤں والی اسپائید رمائیٹس  
(Two spotted spider mites)

سرخ جوئیں (Red mites)

تھرپس (Thrips)

### جوؤں اور تھرپس کے کنٹرول کا اسپیشسلسٹ

## سُندُبیوں کا بروقت کنٹرول



## ٹینڈوں سے بھرپور کپاس

اس مرحلے پر سفید مکھی کے ساتھ ساتھ سُندُبیوں خصوصاً گلابی سُندُبی کا حملہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور سُندُبیوں کو کنٹرول کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔  
لہذا مودو بینٹو کے ساتھ ڈیس سُپر ملا کر اسپرے کریں تاکہ سفید مکھی کے ساتھ ساتھ سُندُبیوں کا بھی بروقت کنٹرول مل سکے۔

### فائد़:

- موثر مکھی مکس پارٹنر • کپاس کی سُندُبیوں کے خلاف موثر

## سفارشات برائے استعمال

*پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان کم از کم 7-10 دن کا وقفہ رہیں۔	80 ملی لیٹرفی ایکٹر	چنتبری سُندُبی گلابی سُندُبی اور امریکین سُندُبی	کپاس

\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ



## سفارشات برائے استعمال

*پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
21 دن	125 ملی لیٹرفی ایکٹر + (بائیوپاور) ایڈجوجوینٹ 250 ملی لیٹرفی ایکٹر	سفید مکھی، ایفڈر	کپاس

\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### طریقۂ استعمال:

ایک ایکٹر پر اسپرے کے لیے 125 ملی لیٹرفی مودو بینٹو کو پانچ گلاس پانی (جس کی پی ایچ 7-6 ہو) میں ملا کر اچھی طرح حل کر لیں۔  
پھر اس میں 250 ملی لیٹرفی باپیو پاور ڈال کر حل کر لیں۔ بنائے گئے محلول کو ایک ایکٹر پر اسپرے کے لیے پانی کی مقدار 120 لیٹر سے 150 لیٹر رکھیں۔  
7 دن کے وقفے سے مودو بینٹو کا دوبارہ اسپرے کریں۔  
اسپرے کے لیے ہالوکون نوزل استعمال کریں۔



### طریقۂ استعمال:

کپاس کی فصل پر ڈیس سُپر کی سفارش کردہ مقدار کو فی ایکٹر 100 سے 120 لیٹرفی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ہاتھ یا نجخ سے چلنے والی ہائی والیوم مشین جس میں ہالوکون نوزل گلی ہوئی ہوں اسپرے کریں۔

سفید مکھی اور بیچے مار مٹاٹے



**ہووبینٹو®**  
ایس سی 240

## بیندھوں سے بھرپور کپاس

مووبینٹو کے دوسرے اسپرے کے ساتھ اسپیٹا میپرڈ بھی ملائیں اور دو مختلف طریقہ اثر کھنے والے زہروں کی بدولت رس چوس کیڑوں کا فوری اور دیر پاکنٹرول پائیں۔

**فوائد:**

- موثر مینک مکس پارٹنر • سبز تیلا، ٹھرپس اور سفید مکھی پر فوری کنٹرول
- پودوں کے ساتھ مطابقت

### سفارشات برائے استعمال

پُنچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
28 دن	150 سے 125 ملی لیٹر فی ایکٹر	سبز تیلا (جیسٹ)، سفید مکھی، ٹھرپس اور ایفڈر	کپاس

\* نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ



### طریقہ استعمال:

اسپیٹا میپرڈ کی سفارش کردہ مقدار کوئی ایکٹر 100 لیٹر پانی میں (جس کی پی ایچ 7-6 ہو) ملا کر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم شین جس میں ہالوکون نوزل لگی ہوئی ہوں اسپرے کریں۔



**سفید مکھی اور بیچے مار مٹاٹے**

- دو طرفہ سرائیت پذیری کی بدولت سفید مکھی اور اس کے چھپے ہوئے بچے جن پر براہ راست اسپرے نہیں پہنچ پاتا، ان پر بھی موثر کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
- فصل کے ہر مرحلے میں قابل استعمال

### سفارشات برائے استعمال

پُنچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
21 دن	125 ملی لیٹر فی ایکٹر + (بائیوپاور) ایڈجوینٹ 250 ملی لیٹر فی ایکٹر	سفید مکھی، ایفڈر	کپاس

\* نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### طریقہ استعمال:

اپک ایکٹر پر اسپرے کے لیے 125 ملی لیٹر مووبینٹو کو پانچ گلاس پانی (جس کی پی ایچ 7-6 ہو) میں ملا کر اچھی طرح حل کر لیں۔ پھر اس میں 250 ملی لیٹر بائیو پاور ڈال کر حل کر لیں۔ بنائے گئے محلوں کو ایک ایکٹر پر اسپرے کے لیے پانی کی مقدار 120 لیٹر سے 150 لیٹر تک ہیں۔

7 دن کے وقفہ سے مووبینٹو کا دوبارہ اسپرے کریں۔ اسپرے کے لیے ہالوکون نوزل استعمال کریں۔

## سُندیوں کا بروقت کنٹرول



## سَبزتیلے اور تھرپس کا خاتمہ



کوریڈور  
75 فیصد ایس پی

اس مرحلے پر سُندیوں کے ساتھ ساتھ سبزتیلا (جیسٹ) اور تھرپس کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیس سپر کے سات کوریڈور کو ملا کر اسپرے کرنے سے سُندیوں اور رس چوس کیڑوں کا موثر کنٹرول ملتا ہے اور کاشنکار کو الگ الگ اسپرے کرنے کے حوالے سے بچت ہو جاتی ہے۔

### سفارشات برائے استعمال

*پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان کم از کم 7-10 دن کا وقفہ رکھیں۔	80 ملی لیٹر فی ایکٹر	چنتبری سُندی گلابی سُندی اور امریکن سُندی	کپاس

\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ



### سفارشات برائے استعمال:

*پی ایچ آئی	شرح استعمال	کیڑے	فصل
14 دن	330 گرام فی ایکٹر	تھرپس، سبزتیلا	کپاس

\*نوت: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### طریقہ استعمال:

کپاس کی فصل پر ڈیس سپر کی سفارش کردہ مقدار کو فی ایکٹر 100 سے 120 لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم مشین سے جس میں ہالوکون نوزل لگی ہو اسپرے کریں۔



### طریقہ استعمال:

سفارش کردہ مقدار کو فی 100 لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم مشین سے جس میں ہالوکون نوزل لگی ہوئی ہو اسپرے کریں۔

نوت: اسپرے کے موقع پر فصل میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔

## پیداوار زیادہ خوشحالی کا وعدہ



- پودے کی غذائی قلت پوری کرے
- مکمل اور متوازن غذا بینت کا ذریعہ
- پتے اور پھولوں کی بہتر نشوونما نتیجہ پیداوار میں اضافہ

### سفارشات برائے استعمال

فصل	شرح استعمال
کپاس	250 ملی لیٹرنی ایکٹر پر



**طریقہ استعمال:**  
لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔

## سائنس ایسی جادو جیسی



### فواائد:

- وسیع الاثر سندھی مارز ہر
- منفرد طریقہ اثر کی بدولت دیر پا اور موثر کنٹرول
- دوسرے مرکبات کے خلاف مدافعت رکھنے والی سندھیوں کے خلاف بھی موثر
- لمسی اثر اور اسپرے شدہ پتوں میں جذب (Translaminar) ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے پتوں کے نیچے چھپی ہوئی سندھیوں کے خلاف بھی موثر

### سفارشات برائے استعمال

فصل	کیٹرے	شرح استعمال	*پی ایچ آئی
25 دن	لشکری سندھی	25-50 ملی لیٹرنی ایکٹر پر	امریکن سندھی
	کپاس	50 ملی لیٹرنی ایکٹر پر	

\*نوٹ: آخری اسپرے اور برداشت کے درمیان وقفہ

### طریقہ استعمال:

مسئلے کے مطابق بیلٹ کی سفارش کردہ مقدار انی ایکٹر کو 100 لیٹر پانی (جس کی پی ایچ 6 سے 7 ہو) میں ملا کر ہاتھ یا انجن سے چلنے والی ہائی والیوم اسپرے مشین جس میں ہالوکون نوزنگی ہوئی ہوں اسپرے کریں۔



**ڈیاپیٹ:**  
بیلٹ کے ساتھ بہترین رزلٹ کے لئے سفارش کردہ مقدار 25ml اس وقت استعمال کریں۔  
جب سندھی یا چھپوئی ہوں۔ یعنی جملے کے ابتدائی مرحلے میں۔  
شدید حملہ کی صورت میں، بہتر اور دیر پا کنٹرول کے لئے 7 دن کے وقفہ سے بیلٹ کا اسپرے دہائیں۔

**پتتوں کے آر پار جانے چھپی سندھی نہ پانے**



## احتیاطی تدابیر

- پرودکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے محلوں کو اسپرے مشین سے بہنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔
- اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمبا کو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمبا کو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اسپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دست انوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کی خالی بوتل / ایکٹ کو پانی میں اچھی طرح سے کھنگال لیں اور زہر آسودہ پانی کو زہر پاشی میں استعمال کر لیں، اور خالی بوتل / ایکٹ کو ضائع کر کے زمین میں دفن کر دیں۔
- زہر اور زہر آسودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگا ہوں کو خراب نہ کریں۔



## بائیر پاکستان (پرائیویٹ) لمیڈ

پلاٹ نمبر 23، سیکٹر نمبر 22، کورنگی ایڈسٹری میل ایریا، کراچی۔

لوایے این: 111-000-227 ویب سائٹ: [www.bayer.com.pk](http://www.bayer.com.pk)



### چشمہ

آنکھوں کی حفاظت کے لیے  
چشمے کا استعمال کریں۔



### ماسک

ماسک کا استعمال کریں تاکہ  
زہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



### دستانے

دستانے پہنیں تاکہ محلوں آپ کی  
جلد میں جذب ہو کر نقصان سے بچائے۔