



ریجنٹ®
80 فیصد ڈبلیو جی

ہر بیالی سے خوشحالی



دھان میں تنے کی سُنڈی کامؤثر حاتمہ

ہر بیالی سے خوشحالی

بائیکار ریجنٹ نہ صرف فصل کو کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ پودوں کی نشوونما میں بہتری لَا کر اچھی پیداوار کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے

فوائد:

- تنے کی سندلیوں کا موثر کنٹرول
- پودوں / چڑوں کی بہتر نشوونما
- پیداواری جھاڑ میں اضافے کا باعث
- صحت مند فصل

نتیجہ: بھرپور پیداوار - زیادہ منافع




سفید، زرد اور گلابی سندلی پر
کنٹرول کے لیے موثر

طریقہ اثر

- کیڑوں کی جلد سے جسم کے اندر جذب ہو کر
- کیڑوں کے منہ کے ذریعے معدے میں داخل ہو کر
- پودے کے اندر سراہیت پذیر ہو کر

ریجنٹ سے پیداوار پراثرات

اپرے شدہ پلاٹ کی کیفیت غیر اپرے شدہ پلاٹ کے مقابلے میں فیصد اضافہ



سفارشات برائے استعمال

نسل	کیڑے میں	شرح استعمال	وقت استعمال
دھان	تنے کی سنڈیاں	پنیری پر استعمال: پنیری کاشت کرنے کے 8-10 دن بعد ریجنٹ تقریباً 4 گرام فی کتناں کے حساب سے اپرے کریں۔ پنیری کی منتقلی کے بعد: • پہلی مرتبہ، پنیری کی منتقلی کے 20-25 دن بعد۔ • دوسری مرتبہ، پنیری کی منتقلی کے 40-45 دن بعد۔ نوٹ: سہولت کے مطابق کھاد میں ملا کر چھٹھے کریں یا اپرے کریں۔	پنیری پر استعمال: 1.5 گرام فی 8 مارلہ پنیری کی منتقلی کے بعد: 30 گرام فی ایکڑ

طریقہ استعمال

1 چھٹے کا طریقہ

30 گرام ریجنٹ کا ساسا شے 250 ملی لیٹر پانی میں ملائیں اور اس محلول کو 10 کلو کھاد یا ریت میں ملائیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک ایکڑ میں چھٹے کریں۔ مکس اور چھٹے کرتے وقت حفاظتی دستانے ضرور پہنیں۔

2 اپرے کا طریقہ

30 گرام ریجنٹ کو 80-100 لیٹر پانی میں ملائیں ایک ایکڑ پر اپرے کریں۔ اپرے کرتے وقت تمام حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔



کتابچہ موبائل ایپ

اب فصلوں کے مسائل اور ان کے حل کی معلومات آپ کی انگلیوں پر۔
بس اپنے موبائل سے پلے اسٹور پر جا کر بارز کتابچہ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔



احتیاطی تدابیر

- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر تنقیح کے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی بینچی، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اپرے نہ کریں۔ زہر کے محلوں کو اپرے مشین سے بینے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شال نہ ہونے دیں۔
- اپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- زہر کے اپرے اور کام کے فورابعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جنم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آسود پانی کو اپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آسودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزر گاہوں کو خراب نہ کریں۔
- شہد کی مکھیوں اور مچھلیوں کے لیے مضر ہے۔



دستانے
دستانے پہننے کا کھول آپ کی
جلدیں جب بوراقسان نہ بچائے۔



ماسک
ماسک کا استعمال یعنی
زہر سانس سے جم بین، افلن بدو۔



چشمہ
آنکھوں پر حفاظت کے لیے
چشمے کا استعمال کریں۔



بائی پاکستان (پرائیویٹ) لمبیڈ

ہیڈ آفس: پلات نمبر 23، سیکٹر 22، کوئٹہ انڈسٹریل ائریا، کراچی 74900

یو اے این: 227-000-111، فیکس: 35060638

