



اطلاعات سس
6 فیصد ڈیلیوجی

زیادہ جھاڑ، سُپر پيداوار



ایک اسپرے سے دہی سٹی، جنگلی جئی اور
چوڑے پتوں والی جرّی بوٹیوں کا بیک وقت مؤثر کنٹرول

زیادہ جھاڑ سپر پیداوار



اٹلانٹس
سپر
6 فیصد ڈبلیو جی

خصوصیات:

- سخت جان گھاس نما اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا بیک وقت کنٹرول
- جڑی بوٹیوں کے بہتر کنٹرول کی وجہ سے جھاڑ کو زیادہ سے زیادہ قابل پیداوار بنائے
- فصل برداشت تک جڑی بوٹیوں سے پاک

استعمال کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل ہدایات کو غور سے پڑھیں

- پہلے پانی کے بعد جب زمین بجائی والے وتر کی حالت میں ہو اور فصل کی عمر تقریباً 35 دن ہو جائے تب اٹلانٹس سپر کا اسپرے کریں۔
- اسپرے کے لیے جڑی بوٹی مار (فلڈ فین جٹ) نوزل استعمال کریں۔
- اگر ضرورت ہو تو اسپرے کے 10 سے 15 دن بعد فصل کو پانی لگائیں۔
- کلراٹھی اور انتہائی ریتیلی زمینوں کے علاوہ ہر قسم کے زمینوں پر استعمال کی سفارش کی جاتی ہے۔

سفارشات برائے استعمال

مقدار استعمال	جڑی بوٹیاں
 6 فیصد ڈبلیو جی سپر 100 گرام فی ایکڑ + بائیوپاور 160 ملی لیٹر فی ایکڑ	گھاس نما جڑی بوٹیاں (جنگلی جئی، دہی سٹی) چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں (باتھو، مینا، جنگلی پالک، بلی بوٹی، مٹری، سینجی اور جنگلی ہالوں)



ایک اسپرے سے دہی سٹی، جنگلی جئی اور
چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں کا بیک وقت مؤثر کنٹرول



کتابچہ موبائل ایپ

اب فصلوں کے مسائل اور ان کے حل کی معلومات آپ کی انگلیوں پر۔
بس اپنے موبائل سے بائر کتابچہ (Kitabcha) ڈاؤن لوڈ کیجئے۔



احتیاطی تدابیر برائے زرعی زہر

- پروڈکٹ پر دی گئی حفاظتی ہدایات اور استعمال کے طریقوں پر سختی سے عمل کریں۔
- زہر کو بچوں، پالتو جانوروں کی پہنچ، آگ اور کھانے پینے کی اشیاء سے دور ٹھنڈی جگہ پر تالے میں رکھیں۔
- زہر کے کام کے دوران حفاظتی لباس، دستانے، ماسک اور عینک استعمال کریں۔
- تیز ہوا میں اور ہوا کی مخالف سمت اسپرے نہ کریں۔ زہر کے محلول کو اسپرے مشین سے بہنے نہ دیں۔
- زہر اور اس کی پھوار سے آنکھوں، منہ، کپڑوں کو بچائیں اور اسے سانس میں شامل نہ ہونے دیں۔
- اسپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پہلے ہاتھ اور جسم دھولیں۔
- زہر کے اسپرے اور کام کے فوراً بعد کپڑوں اور جوتوں کو تبدیل کر دیں۔
- اسپرے مشین، حفاظتی کپڑوں، دستانوں، ہاتھوں، آنکھوں اور جسم کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھولیں۔
- زہر کی خالی بوتلوں اور زہر کے خالی پیکٹ کو پانی سے اچھی طرح دھو کر زہر آلود پانی کو اسپرے مشین میں ڈالیں اور زہر کی خالی بوتلوں اور خالی پیکٹ کو زمین میں دفن کر کے ضائع کر دیں۔
- زہر اور زہر آلودہ پانی سے آبی ذخائر اور آبی گزرگاہوں کو خراب نہ کریں۔
- شہد کی مکھیوں اور مچھلیوں کے لیے مضر ہے۔



دستانے

دستانے پہنیں تاکہ گول آپ کی جلد میں جذب ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔



ماسک

ماسک کا استعمال کریں تاکہ زہر سانس سے جسم میں داخل نہ ہو۔



چشمہ

آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمے کا استعمال کریں۔



بائر پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ

ہیڈ آفس: پلاٹ نمبر 23، سیکٹر 22، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900

یو اے این: 111-000-227، فیکس: 35060638

